



## Informationsblatt Photodynamische-Therapie mit Metvix

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Sie haben sich zu einer Photodynamischen-Therapie mit dem Produkt Metvix® der Firma Galderma entschieden. Wir möchten Sie gerne über die Wirkung des Metvix® und möglichen Nebenwirkungen nach der Behandlung hinweisen.

- Die Metvix® Creme dringt während der Einwirkzeit von drei Stunden in das veränderte Gewebe ein und macht dies lichtempfindlich. Durch die nachfolgende Belichtung mit kaltem Rotlicht werden die vorbehandelten Zellen gezielt zerstört. Die behandelten Zellen werden innert wenigen Tagen abgestossen und durch frische Zellen ersetzt. Die umliegende gesunde Haut bleibt dabei weitestgehend unbeeinträchtigt.
- Mögliche Nebenwirkungen:
  - Schmerzen an den behandelten Stellen
  - Brennendes Gefühl
  - Jucken
  - Krustenbildung
  - Blasen
  - Eiterung
  - Hautinfektion
  - Hautabschälung
  - Hautblutung
  - Hyper-/Hypopigmentation
  - Hautausschlag
  - Ekzem
  - Kopfschmerzen
  - Übelkeit
  - Augenreizung
  - Müdigkeit
  - Schwindel
- In seltenen Fällen können Erytheme (Rötungen) und Ödeme (Schwellungen) auftreten, die ein bis zwei Wochen andauern können.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme dieses Informationsblattes.

